


## Sitone



ITCF



H. Reinhard

<b>Nom :</b>	Sitone – <i>Sitona lineatus</i>
<b>Symptômes :</b>	Présence d'un coléoptère brun-gris de 4 à 5 mm de long. Morsures en arc de cercle sur le pourtour des premières feuilles.
<b>Dégâts possibles :</b>	<p>En cas de fortes attaques et lors de printemps froid et sec qui ralentit la croissance de la plante, les dégâts peuvent être importants. En général, ces dégâts sont plus spectaculaires que dommageables.</p> <p>Les larves se développent dans les nodosités des légumineuses et peuvent ainsi perturber l'alimentation en azote des plantes, ce qui représente le dommage le plus important pour la culture.</p>
<b>Lutte préventive :</b>	Favoriser la croissance au départ de la culture.
<b>Lutte directe :</b>	<p>Vu qu'il n'est pas possible de lutter contre les larves dans le sol, il faut combattre les adultes avant la ponte. Le seuil d'intervention est de 5 à 10 morsures par double-foliole sur le deuxième étage foliaire.</p> <p>Une fois que les adultes ont atteint le troisième étage des feuilles, le succès de la lutte n'est plus garanti.</p> <p><b>La lutte est soumise à autorisation en PER.</b> Elle n'est que très rarement utile.</p>
<b>Remarque :</b>	Le sitone s'attaque également à d'autres légumineuses cultivées.